



Avertissements[®]

agricoles Auvergne & Limousin

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 7 Octobre 1986

n°16

	(GROSSE ALTISE
) Aucun traitement ne se justifie
C O L Z A) CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL
) Premières captures - Attendre pour traiter
CEREALES	Nombreux pucerons sur repousses

COLZA

2 feuilles (B2)
Stade à 3-4 feuilles (B3 - B4)

GROSSE ALTISE

★ Situation

tous secteurs.

Les captures sont toujours très faibles (souvent nulles) en

Les morsures sont rares.

★ Préconisation

*Aucun traitement ne se justifie.**Maintenir une surveillance.*

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

★ Situation

Début du vol dès les premiers jours d'Octobre, dans plusieurs localités des zones habituellement concernées par ce ravageur : TRETEAU (03), MEZEL, THURET (63).

Quelques captures sont même notées pour la première fois près de BRIOUDE (43) et à GIGNAT (63).

★ Préconisation

*Il est trop tôt pour intervenir.**Attendre nos conseils dans un prochain bulletin.*

Le seul moyen d'observer cet insecte est la mise en place d'une cuvette jaune dans vos parcelles (cuvette sur le sol).

P.1.5.2



La détection des dégâts dans un secteur la campagne précédente est aussi un indice : colza à port buissonnant du fait de la destruction du bourgeon terminal par les larves.

La lutte contre ce ravageur consiste à détruire les adultes avant la ponte.

Description de l'adulte :

Longueur : 2,5 à 3,5 mm

Couleur : noir brillant

Bout des pattes : roux

Tache dorsale blanchâtre.

CEREALES

PUCERONS VECTEURS DE LA JAUNISSE NANISANTE

★ Situation

Les repousses de céréales sont nombreuses et celles-ci sont très fortement infestées de pucerons, notamment dans l'ALLIER et le PUY-DE-DOME.

★ Préconisations

- *Eliminer rapidement les repousses (pensez aussi à désherber vos colzas envahis par les graminées).*
 - *Dès la levée des céréales, soyez très attentifs.*
- Un réseau de surveillance va se mettre en place.*

